
AGROGLOBE



katalog sredstava za

ZAŠTITU BILJA 2023.



O NAMA

Agroglobe d.o.o. je jedna od vodećih kompanija u agraru, osnovana 2004. godine, sa sedištem u Novom Sadu – prestonici srpske poljoprivrede.

Kompanija se bavi uvozom i distribucijom sredstava za zaštitu bilja, semena, mineralnog đubriva, poljoprivredne mehanizacije, sistema za navodnjavanje i prometom agroproizvoda. Značajan deo poslovanja bazira se na skladištenju i izvozu poljoprivrednih proizvoda.

Distribucija sredstava za zaštitu bilja se realizuje u saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima.
Sa ciljem kompletiranja ponude i adekvatnog odgovora zahtevima tržišta, kompanija Agroglobe je 2022. postala većinski vlasnik hemijske industrije Župa iz Kruševca, koja svojom dugom tradicijom, iskustvom i značajnim proizvodnim kapacitetima garantuje visok kvalitet svojih proizvoda.

Program semena se realizuje kroz proizvodnju i distribuciju semena pšenice, ječma, kukuruza, soje, suncokreta i uljane repice. U saradnji sa renomiranim selekcionim kućama, Agroglobe je 2022. pokrenuo proizvodnju semena kukuruza pod sopstvenim brendom. Pre izlaska na tržište hibridi prolaze kroz mrežu ogleda u Srbiji i okolnim zemljama. Oglede izvodimo samostalno i u saradnji sa kompanijama specijalizovanim za testiranje hibrida i sorti. Samo hibridi koji se odlikuju stabilnošću i prinosima boljim od standarda se registruju i uvode na tržište. Proizvodnja hibridnog semena se odvija u Srbiji u organizaciji i pod punom kontrolom Agroglobe, od njive do upakovane vreće. Dorada se vrši u sopstvenim doradnim centrima u Zrenjaninu i Novom Sadu.

Agroglobe je dugogodišnji zastupnik kompanije New Holland, jednog od lidera u proizvodnji poljoprivredne mehanizacije.

> *“Težeći da ostvarimo našu VIZIJU da budemo kompanija napretka i inovacija, otvorena platforma za buduće generacije i prosperitet zajednice naša MISIJA je da ulaganjem u ljude, brigom o njihovom rastu i razvoju, pouzdanošću prema svim partnerima, dajemo primer visokog stepena društvene odgovornosti.”*



SADRŽAJ

Herbicidi 10

· DIKAGLOBE 480SL 12
· DILER® 14
· GLIFOTOP 16
· GOLTIX® GOLD 18
· MERLIN FLEXX® 20
· MEZOKOR 22
· NIXON 24
· POWERTWIN® 26
· SHIRO 500 WG 28
· SIRAKCID 30
· TOMIGAN® XL 32
· TUBERON® 34
· ŽUPAZON 36

Fungicidi 38

· BLAUVIT 40
· BLAUVIT ULTRA SC 42
· BORDOVSKA ČORBA S-20 44
· CUSTODIA® 46
· MAGANIC® 48
· MAXENTIS® 50
· SPYRALE® 52
· ŽUPAVENT SC 54

Insekticidi 56


· ABAMEC 58
· AGRODECI 60
· LAIDIR 62
· TAJFUN 64
· TEFLIX 66


Regulatori rasta 56

· NEXT® 68

PROGRAM ZAŠTITE KUKURUZA








PROGRAM ZAŠTITE ŠEĆERNE REPE







HERBICIDI

· DIKAGLOBE 480SL · DILER® · GLIFOTOP
· GOLTIX® GOLD · MERLIN FLEXX® · MEZOKOR
· NIXON · POWERTWIN® · SHIRO 500 WG · SIRAKCID
· TOMIGAN® XL · TUBERON® · ZUPAZON



DIKAGLOBE 480 SL

1l

Dikaglobe 480 S je selektivni translokacioni folijarni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuza.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  dikamba 480 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrovani rastvor (SL)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine

PRIMENA

KUKURUZ
Primenjuje se posle nicanja useva , kada je kukuruz u fazi 2-5 listova (faza 12-15 BBCH skale), a korovi od faze kotiledona do 6 razvijenih listova, u količini primene od 0,5-0,7 l/ha (odnosno 5-7 ml na 100 m^2).

Utrošak 200-400 l vode.

SPEKTAR DELOVANJA

u količini primene od 0,5 l/ha preparata (odnosno 5ml na 100m^2):
· štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*),
· štir obični (*Amaranthus retroflexus*),
· vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*),
· pepeljuga (*Chenopodium album*),
· pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
· lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*),
· tatula obična (*Datura stramonium*),
· samonikli suncokret (*Helianthus annuus*),
· boca obična (*Xanthium strumarium*)

u količini primene od 0,7 l/ha preparata (odnosno 7ml na 100m^2):
· sve navedene korovske vrste i poponac njivski (*Convolvulus arvensis*)



NAPOMENA:

Ne sme primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), na slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa), kao ni na temperaturama iznad 250C.

Nema opasnosti za naredne biljke u plodoredu.

U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama može se sejati kukuruz, pšenica i sirak ukoliko je prošlo 45 dana od primene preparata.

Preparat je fitotoksičan za sve širokolisne useve i zasade i zbog toga u toku primene treba sprečiti zanošenje preparata na osetljive biljne vrste.

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.



ADAMA

DILER®

1l 5l

Diler® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu soje, suncokreta i šećerne repe.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  kletodim 120g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrat za emulziju (EC)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene za soju, suncokret i šećernu repu
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine

PRIMENA

SUNCOKRET, ŠEĆERNA REPA, SOJA

• 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao što su proso korovsko (*Echinochloa crus galli*), vrste iz roda muhari (*Setaria spp.*) i sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*) tretiranjem kada su korovi u fazi 3-5 listova, a najkasnije u fazi bokorenja
• 1,2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova kao što je divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*) tretiranjem kada je korov u fazi 3-5 listova (visina do 30 cm)
• 2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova kao što je pirevina obična (*Agropyrum repens*) kada je korov visine 15-20 cm

Utrošak vode 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

• proso korovsko (*Echinochloa crus galli*)
• vrste iz roda muhari (*Setaria spp.*)
• sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*)
• divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*)
• pirevina obična (*Agropyrum repens*)



NAPOMENA:

Izbegavati primenu ako se u vreme tretmana i 36 sati posle tretmana očekuju temperature preko 28°C. Prvi simptomi delovanja se uočavaju obično 7-10 dana nakon primene. U soji i suncokretu napraviti razmak od 5-7 dana između primene herbicida za širokolisne korove i Diler®-a. Mora se sačekati da se gajeni usev oporavi od herbicidnog stresa, u suprotnom može doći do slabijih ili jačih fitotoksija u vidu hloroze, nekroze lista, zaostajanja u porastu, pa i propadanja biljaka.

PREDNOSTI PREPARATA DILER®

• Diler® je od svih graminicida najselektivniji, najbezbedniji po gajenu biljku. Najmanje je agresivan graminicid u uslovima visokih temperatura, i ako se primenjuje u kasnijim fenofazama razvoja (pred butonizaciju ili cvetanje) gajene biljke
• Rešenje je i za rezistentne-otporne biotipove sirka na druge herbicide u ovu namenu "fopove"
• Stabilan pri jakoj sunčevoj insolaciji
• Efikasnost ne izostaje i pri tretmanu po oblačnom vremenu



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

GLIFOTOP

1l 20l

Glifotop je neselektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodisih i višegodišnjih korova na nepoljoprivrednim površinama.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  glifosat - IPA so 480 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrovanog rastvora (SL)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene

PRIMENA

GLIFOTOP je totalni sistemični herbicid širokog spektra delovanja. Kontaktni, translokacioni i nerezidualni herbicid , inhibitor likopen ciklaže. Preparat se, u zavisnosti od prisutnih korovskih vrsta i inteziteta zakorovljenosti, primenjuje u količinama od 3-12 l/ha kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, uz utrošak vode 200-400l /ha.
Aktivna materija glifosat je efikasna u suzbijanju korova i u drugim kulturama kao što su :
· zasadi jabuke, kruške, kajsije, masline i vinove loze u dozi primene od 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova , 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova , 8-12 l/ha za suzbijnaje izuzetno otpornih višegodišnjih korova , tretiranjem i kada su korovi visine 15-40 cm.
· strništa u dozi primene od 3-10 l/ha u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova)

SPEKTAR DELOVANJA

U količini od 3 l/ha:
· hajdučka trava (*Achilea milefolium*)
· štir obični (*Amaranthus retroflexus*)
· modri tetrljan (*Ballota nigra*)
· pepeljuga obična (*Chenopodium album*)
· vlasulja oštra (*Bromus sterilis*)
· čekinjuša (*Crepis setosa*)
· svračica crvena (*Digitaria sanquinalis*)
· broćika obična (*Galium mollugo*)
· cecelj (*Oxalis acetosella*)
· bokvica mala (*Plantago lanceolata*)
· ptičiji dvornik (*Plygonum aviculare*)
· štavalj (*Rumex crispus*)
· muhar sivi (*Setaria glauca*)
· muhar lepljivi (*Setaria verticilata*)
· muhar zeleni (*Sateria viridis*)
· pomoćnica obična (*Solanum nigrum*)
· jednogodišnji čistac (*Stenactis annua*)
· pirevina obična (*Agropyrum repens*)
· palamida njivska (*Cirsium arvense*)
· hudolentica kanadska (*Erigeron canadensis*)
· mlečika obična (*Euphorbia cyparisias*)
· grkuša (*Picris hieracioides*)
· sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*)
· maslačak (*Taraxacum officinale*)
· slabo suzbija:
· zvezdica (*Aster salignus*)
· poponac njivski (*Convolvulus arvensis*)
· zubača (*Cynodon dactylon*)
· dobričica (*Glechoma hederacea*)
· crni slez (*Malva silvestris*)
· reinutrija (*Reynoutria japonica*)

U količini od 6 l/ha:
· pirevina obična (*Agropyrum repens*)
· zvezdica (*Aster salignus*)
· palamida njivska (*Cirsium arvense*)
· mlečika obična (*Euphorbia cyparisias*)
· grkuša (*Picris hieracioides*)
· sirak divlji (*Sorghum halepense*)
· maslačak (*Taraxacum officinale*)
· poponac njivski (*Convolvulus arvensis*)
· zubača (*Cynodon dactylon*)
· crni slez (*Malva silvestris*)
· reinutrija (*Reynoutria japonica*)

U količini od 12 l/ha:
· poponac njivski (*Convolvulus arvensis*)
· zubača (*Cynodon dactylon*)
· crni slez (*Malva silvestris*)
· reinutrija (*Reynoutria japonica*)



NAPOMENA:

Manje količine sredstva za zaštitu bilja se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, kada su korovi u ranijim fazama porasta, povoljnim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.

Veće količine sredstva za zaštitu bilja se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kada su korovi u kasnijim fazama porasta, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.

Tretirana površina se ne sme obrađivati najmanje 7 dana od dana primene. Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša i korišćenje osušene korovske mase za ishranu mlečne stoke. Ispaša i korišćenje osušene korovske mase tretiranih površina za ishranu ostale stoke je moguća 7 dana posle primene. Slama tretiranih površina se ne sme koristiti za primenu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća.

Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva ali bez dodatnog tretiranja herbicidima. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve I zasade.



ADAMA

GOLTIX® GOLD

5l 10l

Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu šećerne repe.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  metamitron 700 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrovana suspenzija (SC)
- **KARENCA:**
  obezbezbeđena vremenom primene za šećernu repu
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom u trokratnoj primeni na istoj površini u toku godine

PRIMENA

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se u kombinaciji sa herbicidom Powertwin®:
Trokratno
• Prvo tretiranje početi posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledona, a većina korova u fazi kotiledona do prva dva lista u količini Goltix® Gold 1 l/ha + Powertwin® 1 l/ha
• Drugo tretiranje obaviti u razmaku 7 do 10 dana nakon prvog, kada krene novi talas korova u količini Goltix® Gold 1,5 l/ha + Powertwin® 1,5 l/ha
• Treće tretiranje obaviti u razmaku 7 do 10 dana nakon drugog, kada krene novi talas korova u količini Goltix® Gold 1,5 l/ha + Powertwin® 1,5 l/ha.
Utrošak vode 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

- teofrastova lipica (*Abutilon teofrasti*)
- štir obični (*Amaranthus retroflexus*)
- ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*)
- pepeljuga obična (*Chenopodium album*)
- palamida njivska (*Cirsium arvense*)
- poponac njivski (*Convolvulus arvensis*)
- pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*)
- tatula obična (*Datura stramonium*)
- muhar veliki (*Echinochloa crus-galii*)
- dvornik ptičiji (*Polygonum aviculare*)
- dvornik obični (*Polygonum persicaria*)
- gorušica poljska (*Sinapis arvensis*)
- pomoćnica obična (*Solanum nigrum*)
- sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*)



NAPOMENA:

Optimalna temperatura za tretiranje je 18-22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). Nakon 4 sata kiša ga ne spira. Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (5% humusa). Ne primenjivati više od 5 l/ha preparata godišnje. Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja može se ponovo sejati samo šećerna repa i cvekla. Na parcelama gde je veliki pritisak pepeljuge, lobode ili kamilice, kao i u sušnim uslovima koristiti maksimalne doze preparata.

PREDNOSTI PREPARATA GOLTIX® GOLD

• Goltix® Gold je unapređena SC-formulacija i patentirana receptura (Evropski patent EP 1228692)
• Pokrovnost preparata je poboljšana zahvaljujući fino mlevenoj aktivnoj materiji (micro-mill-tehnologija)
• Poboljšana je UV-stabilnost aktivne supstance dodavanjem posebno čistih, dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina
• Izražena je adsorpcija preko lista korova i bolje delovanje na korove u odnosu na staru SC formulaciju i paralele na tržištu. Istovremeno je i dalje zadržana visoka tolerantnost šećerne repe prema ovom herbicidu

Goltix® Gold je osnovni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi. Radi proširenja spektra delovanja kao i za uništavanje problematičnih korova (pepeljuga, štir, divlje paprike, pomoćnica...), Goltix® Gold je neizostavan partner preparat herbicidima na bazi fenmedifama i etofumesata. Može se kombinovati i sa drugim herbicidima koji se primenjuju u šećernoj repi (triflusulfuron-metil, klopiralid...). Goltix® Gold deluje i preko zemljišta, gde ima izvesno rezidualno delovanje, ali nova formulacija ima još izraženije delovanje preko lista korova, pa je celishodno da se primenjuje samo posle nicanja korova. Najefikasniji je na korove koji su tek ponikli do faze 2 lista.



MERLIN FLEXX

1l 5l

Merlin flexx je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  izoksaflutol 240 g/l
  PROTEKTANT
  ciprosulfamid 240 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentovana suspenzija (SC)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene za kukuruz
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine

PRIMENA

KUKURUZ
Primenjuje se u količini od 0,4 l/ha tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova, ili tretiranjem posle nicanja useva i korova, a najkasnije do razvoja trećeg lista kukuruza (do faze 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 4 lista. Zahvaljujući protektantu , koristi se puna doza preparata kako pre nicanja tako i u fazama do trećeg lista kukuruza.

Utrošak vode 150 -400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

Širokolisni korovi:
· ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*),
· boca obična (*Xanthium strumarium*),
· gorušica poljska (*Sinapis arvensis*),
· dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*),
· lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*),
· lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*),
· pepeljuga obična (*Chenopodium album*),
· pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*),
· pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
· tarčužak (*Capsella bursa pastoris*),
· tatula obična (*Datura stramonium*),
· štir obični (*Amaranthus retroflexus*).
Uskolisni (travni) korovi:
· proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*),
· muhar zeleni (*Setaria viridis*),
· muhar sivi (*Setaria glauca*),
· sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*)

NAČIN DELOVANJA

Korovi usvajaju obe komponente listom i korenom. Delovanje herbicidne materije izoksaflutola zasniva se na inhibiciji sinteze karotenoida. To se ispoljava kroz karakteristični simptom, promene boje lista iz zelene u belu. Izbeljivanje zatim prelazi u nekrozu (sušenje) što dovodi do konačnog uvenuća korovskih biljaka. Ciprosulfamid podstiče metabolizam kukuruza i ubrzava neutralisanje herbicida (uloga protektanta), što Merlin Flexx čini izuzetno selektivnim herbicidom. Merlin Flexx ima osobinu da najduže može "čekati" kišu. Sa svakom narednom kišom dolazi do reaktivacije što odezbeđuje produženo delovanje.



NAPOMENA:

Može se mešati sa drugim preparatima. Pre primene napraviti probu mešanja, kod primene preparata posle nicanja kukuruza, ne mešati ga sa EC formulacijama. Radi pojačanog delovanja na neke jednogodišnje uskolisne korove, preparat Merlin Flexx se može mešati sa preparatima na bazi S-metolahlora u periodu posle setve a pre nicanja useva. Ukoliko dođe do preoravnja useva ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati kukuruz i krompir, uz plitku obradu zemljišta, mesec dana posle tretiranja. Dva meseca nakon tretiranja moguće je sejati lucerku i mrkvu (uz plitku obradu zemljišta) ili sirak i detelinu (uz jedno oranje). Upotreba preparata Merlin Flexx u kukuruzu ne ograničava setvu bilo koje druge kultura u plodoredu –zato se mogu sejati sve ozime kulture u jesen, a posebno sve prolećne kultura u proleće.



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

MEZOKOR

250ml 1l

Mezokor je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  mezotrion 480 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentovana suspenzija (SC)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine

PRIMENA

KUKURUZ
Primenjuje se nakon nicanja kada je usev u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH skale), a širokolisni korovi u fazi od 2-8 listova u količini primene 0,15-0,25 l / ha.

Utrošak vode je od 200-400 l/ha .

SPEKTAR DELOVANJA

- obična pepeljuga (*Chenopodium album*),
- tatula (*Datura stramonium*),
- pomoćnica-kereće grožđe (*Solanum nigrum*),
- čučak (*Xanthium strumarium*);
- teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*),
- štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*),
- obični štir (*Amaranthus retroflexusus*),
- suncokret (*Helianthus annuus*),
- vijušac (*Bilderdykia convolvulus*),
- poponac (*Convolvulus arvensis*)



NAPOMENA:

Radi proširenja spektra delovanja preparat se može mešati sa herbicidima na bazi nikosulfurona i rimsulfurona. Ne mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije a mogućnost mešanja sa drugim preparatima treba prethodno ispitati na manjoj površini.

Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

NIXON

1l 5l

Nixon je selektivni, sistemični translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje uskolisnih - travnih i nekih širokolisnih korova.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  nikosulfuron 40g/l
- **FORMULACIJA:**
  uljna disperzija (OD)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene
- **BROJ TRETIRANJA:**
  u jednoj godini na istoj površini jednom pri jednokratnom do dva puta pri dvokratnom tretiranju.

PRIMENA

KUKURUZ
U zavisnosti od prisutnih korovskih vrsta i inteziteta zakorovljenosti useva, primenjuje se :
Jednokratno
u količinama od 1,0 - 1,25 l/ha kada usev kukuruza ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale), a korovi u fazi nicanja do 6 razvijenih listova
Dvokratno
a) prvi tretman u količini od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m^2), tretiranje kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao
b) drugi tretman u količini od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m^2) tretiranjem kada su se korovi regenerisali a divlji sirk visine 15-20 cm.
Utrošak vode 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

- proso korovsko (*Setaria glauca*)
- zeleni muhar (*Sateria viridis*)
- sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*)
- sirak divlji iz rizoma (*Sorghum halepense (r)*)
- štir obični (*Amaranthus retroflexus*)
- vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*)
- pepeljuga obična (*Chenopodium album*)
- srcolisna pepeljuga (*Chenopodium hibridum*)
- pomoćnica obična (*Solanum nigrum*)
- teofrastova lipica (*Abutilon teophrasti*)
- tatula obična (*Datura stramonium*)
- veliki muhar (*Echinochloa crus-galli*)
- poponac njivski (*Convolvulus arvensis*)
- samonikli suncokret (*Helianthus annus*)
- dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*)
- boca obična (*Xanthium strumarium*)



NAPOMENA:

Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Aktivna supstanca nikosulfuron spada u grupu ALS inhibitora, odnosno u jedinjenja sa visokim rizikom za pojavu rezistentnosti.

Može dovesti do prolaznog usporenijeg rasta useva kukuruza i bledila lišća ukoliko se: neposredno pre primene sredstva za zaštitu bilja primene organofosforni insekticidi, u vreme primene sredstva za zaštitu bilja jave nepovoljni vremenski uslovi (izrazito vlažno i hladno vreme satemperaturom < 5 C ili izrazita suša, u slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva u kome je primenjen preparat, može se sejati samo kukuruz, a pšenica četiri meseca kasnije.

Na tretiranim površinama ne sme se gajiti šećerna repa 18 meseci, soja i pasulj 10 meseci, lucerka 12 meseci.

Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove NIXON se može mešati sa preparatima na bazi sledećih aktivnih materija: dikamba, 2,4-D, bentazon, mezotrion.



ADAMA

POWERTWIN®

5l

Powertwin® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe.

- **AKTIVNA MATERIJA:**

  fenmedifam 200 g/l
  etofumesat 200 g/l

- **FORMULACIJA:**

  koncentrovana suspenzija (SC)

- **KARENCA:**

  obezbeđena vremenom primene za šećernu repu

- **BROJ TRETIRANJA:**

  na istoj površini u toku godine-jednom u dvokratnoj samostalnoj primeni ili jednom u trokratnoj primeni u kombinaciji sa herbicidom Goltix® Gold

PRIMENA

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se u kombinaciji sa herbicidom Goltix® Gold: Trokratno

- Prvi tretman izvršiti posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledonih listova (faza 10 BBCH skale) a većina korova u fazi kotiledonih listova do prva dva razvijena lista. Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1 + 1 l/ha
- Drugi tretman izvršiti 7-10 dana nakon prvog tretmana. Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1,5 + 1,5 l/ha
- Treći tretman izvršiti 7-10 dana nakon drugog tretmana. Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1,5 + 1,5 l/ha

Utrošak vode 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

- ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*)
- pepeljuga obična (*Chenopodium album*)
- pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*)
- gorušica poljska (*Synapis arvensis*)
- dvornik ptičiji (*Polygonum aviculare*)
- vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*)
- tatula obična (*Datura stramonium*)
- pomoćnica obična (*Solanum nigrum*)
- muhar veliki (*Echinochloa crus-galli*)
- divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense (s)*)



NAPOMENA:

Powertwin® je dvokomponentni herbicid folijarnog i rezidualnog delovanja. Fenmedifam deluje isključivo preko lista na jednogodišnje širokolisne korove, dok etofumesat deluje preko zemljišta na širokolisne i uskolisne korove. Usvaja se koleoptilom od strane travnih korova i korenom kod širokolisnih korova i translocira se u listove. Inhibira razvoj meristema, usporava deobu ćelija i obrazovanje kutikule. Fenmedifam inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Ove dve aktivne materije deluju u sinergizmu. Powertwin® se može mešati sa preparatima na bazi metamitrona, triflusulfuron-metil i klopiralida, u cilju proširenja spektra delovanja. Ako je temperatura vazduha iznad 23°C, nije preporuka da se prska, kao ni ako se očekuju niske noćne temperature ili velike temperaturne oscilacije; na lakim peskovitim zemljištima, sa niskim sadržajem humusa ili na preteškim zemljištima (sa visokim sadržajem humusa).



SHIRO 500 WG

120g

Shiro 500 WG je sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  triflusulfuron-metil 500g/kg
- **FORMULACIJA:**
  vododisperzne granule (WG)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene.
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom (dvokratno) na istoj površini u toku godine

PRIMENA

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se jednokratno ili dvokratno u količini: 30 g/ha + 30 g/ha (0,3g + 0,3g na 100m^2) od nicanja šećerne repe do zatvaranja redova (faze 10-39 BBCH skale).
Prvo tretiranje se obavlja kada je šećerna repa iznikla 70-90% , a korovi su u fazi od kotiledona do 2 lista; drugo tretiranje 7-14 dana kasnije.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

· lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*),
· dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*),
· dvornik obični (*Polygonum persicaria*),
· gorušica poljska (*Sinapis arvensis*),
· pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
· ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*),
· štir obični (*Amaranthus retroflexus*),
· tatula obična (*Datura stramonium*),
· lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*),
· graor krtolasti (*Lathyrus tuberosus*),
· vijušac njivski (*Bilderykia convolvulus*),
· pepeljuga obična (*Chenopodium album*),
· poponac njivski (*Convolvulus arvensis*),
· palamida njivska (*Cirsium arvense*),
· boca obična (*Xanthium strumarium*).

NAČIN DELOVANJA

U korovskoj biljci inhibira biosintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) i na taj način stopira deobu ćelija i rast biljaka. Simptomi delovanja prvo se javljaju na meristemskim tkivima.



NAPOMENA:

Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina. U kombinaciji sa preparatima na bazi fenmedifama i desmedifama ne sme se primenjivati na temperturama preko 20°C. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

SIRAKCID

1l 5l

Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  fluazifop-p-butil 150 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrata za emulziju (EC)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene
- **BROJ TRETIRANJA:**
  u jednoj godini na istoj površini jednom pri jednokratnom do dva puta pri dvokratnom tretiranju.

PRIMENA

SUNCOKRET
Primenjuje se u količini od 0,8 - 1,3l/ha i to :
- kada je usev suncokreta u fazi od dva razvijena lista do pojave butona (faze 12-39 BBCH), odnosno, dokle god se mehanizacijom može ući u usev, a da se ne ošteti.
- kada su jednogodišnji korovi u fazi aktivnog porasta ponika od 2 - 6 razvijenih listova, a osetljivi višegodišnji u fazi do početka cvetanja.

Utrošak vode je 200-400 l/ha.

Preparati na bazi aktivne materije fluazifop-p-butil su efikasni za suzbijanje korova u drugim kulturama :
Soja- kada su korovi u fazi 3-5 listova a pre cvetanja useva
Šećerna repa- u fazi od nicanja do početka cvetanja , a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta
Jabuka, kruška, dunja – u toku vegetacije zasada do početka cvetanja počev od prve godine uzgoja , a korovi u fazi 3-5 listova
Krompir, luk – u toku vegetacije useva najkasnije do početka cvetanja , a korovi u fazi 3-5 listova

SPEKTAR DELOVANJA

· divlji ovas (*Avena fatua*),
· svračica (*Digitaria sanguinalis*),
· proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*),
· zeleni muhar (*Setaria glauca*) ,
· sirak (*Sorghum halepense* - semenski i iz rizoma),
· pirevina (*Agropyrum repens*),
· zubača (*Cynodon dactylon*)



NAPOMENA:

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno .

Postoji mogućnost pojave antagonizma pri mešanju sa drugim aktivnim supstancama namenjenim suzbijanju širokolisnih korova .

Ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima.



ADAMA

TOMIGAN® XL

1l 5l

Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  fluroksipir 100 g/l
  florasulam 2,5 g/l
- **FORMULACIJA:**
  suspoemulzija (SE)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene za pšenicu
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine

PRIMENA

OZIMA PŠENICA
Primenjuje se posle nicanja korova kada je pšenica u fazi tri razvijena lista pa do pojave zastavičara (faza 13-39 BBCH skele) u količini 0,8 - 1,5 l/ha.

Utrošak vode 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

- vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*)
- prstenak poljski (*Anthemis arvensis*)
- žavornjak obični (*Consolida regalis*)
- broćika lepuša (*Galium aparine*)
- bulka obična (*Papaver rhoeas*)
- stisnuša kravlja (*Thlaspi arvense*)
- mišjakinja obična (*Stellaria media*)
- čestoslavica pršljenasta (*Veronica hederifolia*)



PREDNOSTI PREPARATA TOMIGAN® XL

- Dvostruki mehanizam delovanja
- Novo rešenje za suzbijanje najznačajnijih širokolisnih korova u strnim žitima, uključujući i najotpornije i karantinske
- Fleksibilan je u primeni



TUBERON

1kg 5kg

Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  metribuzin 700 g/kg
- **FORMULACIJA:**
  vododisperzne granule (WG)
- **KARENCA:**
  Soja - obezbeđena vremenom primene
  Krompir i paradajz – 42 dana
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine

PRIMENA

SOJE
Primenjuje se posle setve, a pre nicanja useva u količini od 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i u količini od 1 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa.

KROMPIR
Primenjuje se posle sadnje, a pre nicanja useva u količini 0,75 kg/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa, 1 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i 1,5 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa.
Posle nicanja useva kada krompir ima razvijenih 5-8 listova (faze 15-18 BBCH skale) u količini 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i u količini od 0,75 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa.

PARADAJZ KOJI SE RASAĐUJE
Primenjuje se 8-10 dana nakon rasađivanja u količini od 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i u količini 0,75 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa.

SPEKTAR DELOVANJA

· lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*),
· štirevi (*Amaranthus spp*),
· ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*),
· loboda obična (*Atriplex patula*),
· repica crna (*Brassica nigra*),
· tarčužak (*Capsella bursa-pastoris*),
· pepeljuge (*Chenopodium spp*),
· konica obična (*Galinsoga parviflora*)
· dvornici (*Polygonum spp*),
· gorušica poljska (*Sinapis arvensis*),
· lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*),
· tušt obični (*Portulaca oleracea*),
· divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*),
· pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
· boce (*Xanthium spp*).

NAČIN DELOVANJA

Metribuzin pripada hemijskoj grupi triazinona. Apsorbuje se korenom i transportuje u ostale delove biljke. Deluje na proces fotosinteze tako što inhibira transport elektrona u fotosistemu II.



NAPOMENA:

Ne sme se primenjivati na slabo humoznim (<1%) i jako humoznim zemljištima (>6%), u usevu paradajza iz semena, u sortama krompira Jarla,Voran,CB 77/40, CB 76/48, a za nove sorte krompira obavezno ispitati selektivnost.
Ne meša se sa drugim sredstvima za zaštitu bilja ako se primenjuje u usevu krompira posle nicanja.
Zbog fitotoksičnosti sprečiti zanošenje kapi na susedne širokolisne useve.

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja useva mogu se ponovo sejati soja i krompir.

· 4 meseca posle primene mogu se sejati, odnosno saditi krompir, soja, lucerka, grašak, paradajz, pšenica, ječam , kukuruz).
· 12 meseci posle primene mogu se sejati kupusnjače, salata, krastavac,bostan, šećerna repa, luk.
· 18 meseci nakon primene mogu se sejati ostale korenasto krtolaste kulture.



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

ŽUPAZON

1l 5l

Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  bentazon u obliku Na soli 480 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrovani rastvor (SL)
- **KARENCA:**
  obezđena vremenom primene za kukuruz
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine

PRIMENA

KUKURUZ
Primenjuje se u količini od 3-4 l/ha posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 1-5 listova (faza 11-15 BBCH skale) a korovi u fazi 2 do 6 listova.

Utrošak vode:200-400 l/ha.

Preparati na bazi bentazona efikasni su za suzbijanje korova i u usevu
· soje: u fazi od prve do treće troliske,
· lucerke i crvene dateline : kada su visine do 15 cm
· krompira : kada je visine do 15 cm
· graška i pasulja :kada su visine 10 do 15 cm, kada je razvijena troliska

SPEKTAR DELOVANJA

· štir obični (*Amaranthus retroflexus*),
· pepeljuge (*Chenopodium album*),
· pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
· lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*),
· tatula obična (*Datura stramonium*),
· vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*),
· suncokret (*Helianthus annuus*),
· boca obična (*Xanthium strumarium*)



NAPOMENA:

Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe, nikosulfurona, rimsulfurona.

Ne sme se mešati sa fluazifop-b butilom preparatima na bazi organofosfornih insekticida, a mogućnost mešanja sa drugim preparatima treba prethodno ispitati na manjoj površini

U slučaju preoravanja ili preventivnog skidanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka.



FUNGICIDI

· BLAUVIT · BLAUVIT ULTRA SC
· BORDOVSKA ČORBA · CUSTODIA® · MAGANIC
· MAXENTIS® · SPYRALE® · ŽUPAVENT SC



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

BLAUVIT

25g 200g 1kg 10kg

Blauvit je nesistemični fungicid i baktericid sa preventivnim delovanjem.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  bakar - hidroksid 770 g/kg
- **FORMULACIJA:**
  kvašljivi prašak (WP)
- **KARENCA:**
  21 dan za stone sorte vinove loze, 28 dana za vinske sorte vinove loze i 14 dana za šećernu repu
- **BROJ TRETIRANJA:**
  najviše 4 puta na istoj površini u toku jedne godine

PRIMENA

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (*Cercospora beticola*) kada je usev u fenofazi 39-49 BBCH skale u dozi primene 2kg/ ha (20g/100m^2).

VINOVA LOZA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (*Plasmopara viticola*) od momenta razvoja prvog lista i začetka lastara do zatvaranja grozda (potpuno dodirivanje bobica) u fenofazama 11-79 BBCH skale u koncentraciji od 0,35 – 0,4 % (35-40 g na 10 l vode).

Utrošak vode za šećernu repu je 400 l/ha, za vinovu lozu 600 -1000 l/ha.

NAČIN DELOVANJA

Bakar-hidroksid inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena, blokira respiratorne procese patogena, usporava biosintezu proteina, smanjuje propustljivost membrane, remeti enzimski sistem patogena. Savršene veličine bakarnih mikročestica u Blauvit-u stvaraju dobru pokrivnu moć što je veoma bitno kod kontaktnih fungicida. Izuzetno se teško spira kišom.

Blauvit se preporučuje u tretmanu jabučastih i koštičavih vrsta voća u toku mirovanja, pre kretanja vegetacije i nakon završene berbe. Joni bakra doprinose racionalnijoj potrošnji vode u ćelijama biljke i jačanje ćelijskog tkiva.



NAPOMENA:

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Ako se primeni u uslovima hladnog i vlažnog vremena može biti fitotoksičan za biljku. Meša se sa sumpornim preparatima uz uslov da reakcija rastvora ostane neutralna i sa mineralnim uljima u toku mirovanja vegetacije. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije i kalcijum polisulfidom. Ne prskati pri brzini vetra većoj od 2-3 m/s. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljen.



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

BLAUVIT ULTRA SC

250ml 1l

Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem, širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive I bakterije.

- **AKTIVNA MATERIJA:**

  bakar hidroksid
  368,40 g/l bakar hidroksida
  tj. 240 g/l bakra iz bakar hidroksida

- **FORMULACIJA:**

  koncentrovana suspenzija (SC)

- **KARENCA:**

  obezbeđena vremenom primene za šećernu repu i malinu
  7 dana za paradjz
  28 dana za vinovu lozu

- **BROJ TRETIRANJA:**

  najviše 4 puta na istoj površini u toku jedne godine

PRIMENA

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.

VINOVA LOZA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji 0,3 – 0,4%. Utrošak vode 600-1000l/ha.

MALINA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara – beli mladari (*Didymella applanata*) u koncentraciji 0,4%. Utrošak vode 300-600l/ha.

PARADAJZ

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (*Phytophtora infestans*) u koncentraciji 0,3 – 0,4%. Utrošak vode 400-600l/ha.

ŠEĆERNA REPA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (*Cercospora beticola*) u dozi od 4l/ha. Utrošak vode 300-600l/ha.

NAČIN DELOVANJA

Bakarne mikro čestice BLAUVIT ULTRA SC omogućavaju veliku pokrivnu moć što je veoma bitno kod kontaktnih fungicida.
Veoma teško se spira kišom. BLAUVIT ULTRA SC se preporučuje u tretmanu vinove loze u toku mirovanja, pre kretanja vegetacije i nakon završene berbe grožđa.
Joni bakra doprinose racionalnoj potrošnji vode u ćelijama biljke i jačanju ćelijskog tkiva.
Inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena.
Blokira respiratorne procese patogena.
Usporava biosintezu proteina.
Smanjuje propustljivost ćelijske membrane.

PREDNOSTI PRIMENE BLAUVIT ULTRA SC

· Trenutna disperzija prilikom pripreme za primenu
· Nema poznatih fitotoksija, ako se primeni prema priloženom uputstvu
· Patogeni ne stiču rezistentnost



NAPOMENA:

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije i kalcijum polisuldom. Meša se sa sumpornim preparatima uz uslov da reakcija rastvora ostaje neutralna i sa mineralnim uljima u toku mirovanja.

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Ako se primeni u uslovima hladnog i vlažnog vremena može biti fitotoksičan za biljku.



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

50g 250g 1kg

BORDOVSKA ČORBA S-20

Bordovska čorba S-20 je folijarni kontaktni i preventivni fungicid.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida 200g/kg bakra
- **FORMULACIJA:**
  kvašljivi prašak (WP)
- **KARENCA:**
  21 dan za stone sorte, 28 dana za vinske sorte vinove loze

PRIMENA

VINOVA LOZA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji od 1,5% (150 g na 10l vode), preventivno u fenofazama 11-79 BBCH skale, po pojavi prvih pega primarnih zaraza, a pre sticanja uslova za sekundarne zaraze i širenje bolesti.

U zavisnosti od potrebe uz utrošak vode od 600 – 1000 l/ha.

NAČIN DELOVANJA

Bakarni joni iz BORDOVSKE ČORBE se postepeno oslobađaju pod uticajem amino ugljene i hidroksi kiseline i njihovih soli koje se nalaze na površini biljke. Bakarni joni se deponuju u ćelijama patogena na koga deluju toksično i sprečavaju klijanje spora.
Mehanizam delovanja je nespecifičan tako da patogeni ne stiču rezistentnost-otpornost.

Dejstvo bakra kod vinove loze utiče na jačanje pokožice bobica i njihovo manje pucanje prilikom većih kiša u fenofazi sazrevanja kao i na bolje sazrevanje lastara vinove loze i bolju otpornost na zimske mrazeve. Poželjno je primeniti ga kod zadnjih tretmana u vinogradima.
Poseduje dobru otpornost na spiranje kišom.



NAPOMENA:

Meša se sa sumpornim preparatima.

Ne sme se mešati sa drugim pesticidima.

Može biti fitotoksičan ukoliko se primeni po hladnom i vlažnom vremenu i nakon dozvoljenog roka za primenu.

Na tretiranim površinama najmanje 21 dan od primene, ne dozvoliti pristup stoke (domaćim životinjama).

Nalazi se na listi registrovanih sredstava za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u ORGANSKOJ PROIZVODNJI.



ADAMA

CUSTODIA®

1l 5l

Custodia® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  tebukonazol 200 g/l
  azoksistrobin 120 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrovana suspenzija (SC)
- **KARENCA:**
  45 dana za pšenicu i ječam
- **BROJ TRETIRANJA:**
  dva puta na istoj površini u toku godine

PRIMENA

PŠENICA I JEČAM
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (*Blumeria graminis*), prouzrokovača rđe (*Puccinia spp.*) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (*Septoria tritici*) tretiranjem od fenofaze vlatanja do faze cvetanja i za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa (*Fusarium spp.*) tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja u količini 0,8 l/ha.

Utrošak vode 200-400 l/ha.

PREDNOSTI PREPARATA CUSTODIA®

- Jedinstvena kombinacija dve proverene i potvrđene aktivne materije u praksi
- Širok spektar delovanja i visoka efikasnost za potpunu kontrolu bolesti lista i klasa kod pšenice i ječma
- Dvostruki mehanizam delovanja odlaže mogućnost razvoja rezistentnosti
- „Zeleni efekat“ nakon primene. Poboljšavaju se fotosintetički procesi, aktivnosti stoma i sl. što rezultuje boljim usvajanjem vode i azota od strane biljaka i poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata. Krajnji rezultat je produženje vegetacije, povećanje prinosa i kvaliteta zrna strnih žita, kao i bolji hektolitar.



NAPOMENA:

Preparat je vrlo otporan na spiranje kišom, 2 sata nakon primene kiša ga ne spira. Kod ječma ispoljava najveći efekat u suzbijanju prouzrokovača različitih pegavosti lista (Pyrenophora teres, Phynchosporium secalis) i pepelnice u fazi kraj bokorenja-početak vlatanja. Nakon tretmana usev je zaštićen do 14-21 dan, u fenofazama pre klasanja pšenice i ječma, odnosno do 7 dana u vreme klasanja-cvetanja pšenice. Kurativno delovanje, iznosi do 72 sata.



ADAMA

MAGANIC®

1l

Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  protiokonazol 175 g/l
  difenokonazol 125 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrat za emulziju (EC)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene za pšenicu i šećernu repu
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine

PRIMENA


PŠENICA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (*Erysiphe graminis*), prouzrokovača rđa (*Puccinia spp.*) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (*Septoria spp.*) tretiranjem u fazi 39 do 69 BBCH skale i za suzbijanje prouzrokovača fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*) tretiranjem u fazi 61-69 BBCH skale u količini 0,8 - 1 l/ha (8 - 10 ml na 100m^2).

ŠEĆERNA REPA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (*Cercospora beticola*) tretiranjem u fazi 39-49 BBCH skale u količini 1 l/ha (10 ml na 100m^2).

Utrošak vode 200-400 l/ha.



PREDNOSTI PREPARATA MAGANIC®

- Jedinstvena kombinacija aktivnih materija na našem tržištu
- Unapređena formulacija triazola Asorbital Tehnologijom sa poboljšanim performansama aktivne komponente (brža penetracija, distribucija i kretanje kroz biljku do ciljnog mesta delovanja), za maksimalnu efikasnost
- Moćan fungicid za potpunu kontrolu patogena u zaštiti pšenice i šećerne repe
- Obezbeđuje visok stepen efikasnosti primenjen i nakon zaraze useva (klijanja spora)



ADAMA

MAXENTIS®

5l

Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  protiokonazol 150 g/l
  azoksistrobin 200 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrovana suspenzija (SC)
- **KARENCA:**
  45 dana za pšenicu i ječam
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine

PRIMENA

PŠENICA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (*Erysiphe graminis*) i prouzrokovača rđa (*Puccinia spp.*) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale i protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*) tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skale u količini 0,8 -1 l/ha (8-10 ml na 100m^2) .

JEČAM

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (*Erysiphe graminis*) i prouzrokovača mrežaste pegavosti lista (*Pyrenophora teres*) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale i protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*) tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skale u količini 0,8-1 l/ha (8-10 ml na 100m^2).

Utrošak vode 200-400 l/ha.

PREDNOSTI PREPARATA MAXENTIS®

- Uravnoteženim odnosom aktivnih materija Maxentis® odlično deluje u svim fazama patogeneze
- Kombinacija triazola i strobilurina koji imaju različit mehanizam delovanja obezbeđuje potpunu kontrolu svih značajnih bolesti lista i klasa pšenice i ječma
- Azoksistrobin je jedini strobilurin koji poseduje sistemično delovanje i ulazi u biljne organe
- Azoksistrobin ima i odlično kontaktno i preventivno delovanje, jer se odlikuje i dobrim vezivanjem za površinu lista
- Protiokonazol je sistemična aktivna materija preventivnog i snažnog kurativnog delovanja
- Pored fungicidnog delovanja Maxentis® ima i pozitivan uticaj na fiziologiju biljke, što rezultira povećanjem prinosa, kvaliteta zrna i boljom adaptacijom biljke u stresnim uslovima





ADAMA

SPYRALE®

51

Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  difenokonazol 100 g/l
  fenpropidin 375 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrat za emulziju (EC)
- **KARENCA:**
  21 dan za šećernu repu
- **BROJ TRETIRANJA:**
  dva puta na istoj površini u toku godine

PRIMENA

ŠEĆERNA REPA

Primenjuje se za suzbijanje pegavosti lista (*Cercospora beticola*), pepelnice (*Erysiphe betae*) i rđe (*Uromyces betae*) u količini od 0.75 l/ha od potpunog zatvaranja redova do faze kada je koren dostigao veličinu za vađenje.

Utrošak vode 200-400 l/ha.

PREDNOSTI PREPARATA SPYRALE®

- Novo rešenje u borbi protiv prouzrokovača ekonomski najznačajnije bolesti lista šećerne repe
- Nova aktivna materija (fenpropidin) na našem tržištu, odlično uklapa fungicid Spyrale® u strategiju zaštite šećerne repe od cerkospore
- Veoma značajan sa aspekta antirezistentne strategije
- Dvostruki je inhibitor različitih enzima u različitim trenucima biosinteze ergsterola u ćeliskim membranama čime je smanjena mogućnost nastanka rezistentnosti gljive *Cercospora beticola*
- Izraženog je kurativnog delovanja, ali i odličan inhibitor klijanja spora te je dobar kako u zaustavljanju već nastalih zaraza tako i u sprečavanju inficiranja, zaraze biljnog tkiva (lista)



NAPOMENA:

U Hrvatskoj kao i u mnogim zemljama Evropske Unije preparat Spyrale® je registrovan u dozi od 1 l/ha.



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA KRUŠEVAC - SRBIJA

ŽUPAVENT SC

250ml 1l 5l

Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  kaptan 480 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrovana suspenzija (SC)
- **KARENCA:**
  21 dan za jabuku
- **BROJ TRETIRANJA:**
  najviše 4 puta na istoj površini u toku jedne godine

PRIMENA

JABUKA I KRUŠKA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda (*Venturia inaequalis*), u koncentraciji 0,25 % (25 ml u 10l vode).

Primenjuje se preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu (faze 10-78 BBCH skale).

Utrošak vode 1000 l/ha.

Tečna formulacija - koncentrovana suspenzija obezbeđuje bolju disperziju u rastvoru za tretiranje i pokrovnost preparata na tretiranoj površini što je veoma značajno za kontaktne fungicide. Aktivna materija kaptan deluje tako što sprečava zarazu i fruktifikaciju-plodonošenje patogena.
Aktivna materije kaptan deluje na više mesta u ćeliji patogena pri čemu patogen ne razvija rezistentnost, veoma je jak inhibitor klijanja spora.

Kaptan je fungicid širokog spektra delovanja i koristi se za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih bolesti kod :
- Vinove loze – plamenjača (*Plasmopara viticola*)
- Višnje, trešnje, breskve, kajsije, šljive – šupljikavost lista (*Stigmina carpophila*)
- Šljive – plamenjača (*Polystigma rubrum*)
- Jagode – siva trulež (*Botrytis cinerea*) I siva pegavost lista (*Mycosphaerella fragariae*)



NAPOMENA:

Tretiranje iz vazduhoplova niije dozvoljeno.

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije, Bordovskom i sumporno- krečnom čorbom, uljnim i EC formulacijama.

Može biti fitotoksičan ako se primenjuje na višim temperaturama u kombinaciji sa preparatima na bazi dimetoata .

Može izazvati promene na pokožici plodova nekih sorti jabuke (Crveni delišes) i kruške (Anžuj) ako se primenjule u fazi precvetavanja i formiranja plodova a naročito ako se primenjuje sa preparatima na bazi sumpora.



INSEKTICIDI

ABAMEC · AGRODECI · LAIDIR · TAJFUN · TEFLIX

REGULATORI RASTA

NEXT®



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

ABAMEC

100ml 1l

Abamec je insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu , povrtarstvu i cvećarstvu.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  abamektin 18g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrata za emulziju (EC)
- **KARENCA:**
  14 dana za višnju
- **BROJ TRETIRANJA:**
  dva puta na istoj površini u toku godine

PRIMENA

ABAMEC se koristi kao insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Blokira električnu aktivnost u nervima i mišićima štetnih organizama.

VIŠNJA
Primenjuje se za suzbijanje crne lisne vaši trešnje (*Myzus cerasi*), u količini 0,75ml u 10 l vode (0,075%), na početku formiranja kolonija vaši na listovima.

Utrošak vode od 600-1000 l/ha.

Daje rezultate 3 dana nakon tretiranja, a nakon 10 dana se vidi visoka efikasnost kod suzbijanja crne lisne vaši.

Aktivna materija abamektin se primenjuje kod :

Kruška - za suzbijanje obične kruškine buve (*Psylla pyri*),
Jabuka - za suzbijanje crvene voćne grinje (*Panonychus ulmi*), atlantskog preglja(*Tetranychus turkestani*),
Krompir - za suzbijanje krompirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*),
Malina- za suzbijanje eriofidne grinje lista (*Phyllocoptes gracilis*), običnog paučinara (*Tetranychus urticae*)
Vinova loza - za suzbijanje eriofidne grinje (*Calepitrimerus vitis*),
Kupina- za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (*Phyllocoptes gracilis*), eriofidne grinje lista maline i kupine (*Acalitus essigi*) , običnog paučinara (*Tetranychus urticae*)
Soja i Pasulj - za suzbijanje atlantskog pregallja(*Tetranychus turkestani*)

NAČIN DELOVANJA

Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu , čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Stimuliše aktivnost tranmitera u nervnom sistemu artropoda, što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa . Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane.
Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina , koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.



NAPOMENA:

Tretiranje se vrši sa zemlje, folijarno. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela.

Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 28°C ili se očekuje da će spoljna temperatura preći tu granicu u toku 2 dana od momenta primene. Preparat ne primenjivati u toku ili neposredno pre padavina.

Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Ne sme se mešati sa sredstvima na bazi sumpora i kaptana i preparatima izrazito kisele i alkalne reakcije.

Odlično sinergično delovanje pokatzuje sa mineralnim i biljnim uljima .



AGRODECI

1l

Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  deltametrin 25g/l
- **FORMULACIJA:**
  Koncentrat za emulziju (EC)
- **KARENCA:**
  21 dan za vinovu lozu
- **BROJ TRETIRANJA:**
  dva puta na istoj površini u toku godine

PRIMENA

VINOVA LOZA

Primenjuje se za suzbijanje prve ili druge generacije sivog grozdovog smotavca (*Lobesia botrana*) u koncentraciji 0,03-0,04% (3-4ml u 10l vode) za suzbijanje prve i u koncentraciji 0,05-0,07% (5-7ml u 10l vode) za suzbijanje druge generacije.

Utrošak vode 600 – 1000 l/ha.

Vreme primene: 10-14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja gusenica.

PREPORUKA ZA PRIMENU:
Aktivna matreija deltametrin se primenjuje kod :
· Pšenica - za suzbijanje žitne pijavice (*Oulema melanopus*)
· Kukuruz -za suzbijanje kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*)
· Krompir- za suzbijanje krompirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*)
· Uljana repica -za suzbijanje repičinog sjajnika (*Meligethes aeneus*)
· Jabuka, breskva , trešnja, šljiva, višnja, kruška...



NAPOMENA:

Ne sme se primenjivati u vreme leta pčela!

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećom uslovima:

· površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 300 m od voda (vodotoka, jezera, bunara i izvorišta voda)

· zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva

· brzina vetra ne sme prelaziti 2 m/s

· rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje

Može se mešati sa: pirimikarbom, hlorpirifos – metilom. Ne sme se mešati sa: preparatima na bazi sumpora, bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije



FMC

LAIDIR

100ml 1l

LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  lambda-cihalotrin 100 g/l
- **FORMULACIJA:**
  kapsulisana suspenzija (CS)
- **KARENCA:**
  15 dana za jabuku i 35 dana za pšenicu.
- **BROJ TRETIRANJA:**
  dva puta na istoj površini u toku godine kod pšenice i jednom na istoj površini u toku godine kod jabuke

PRIMENA

JABUKA
Primenjuje se za suzbijanje jabučnog smotavca (*Cydia pomonella*) i zelene leptiraste vaši (*Aphis pomi*) u koncentraciji 0,01% a uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha.
PŠENICA
Primenjuje se pri pojavi imaga žitne pijavice (*Lema melanopus*) u količini od 50 - 75 ml/ha uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha.

Aktivna materija lambda- cihalotrin se primenjuje kod :
· Uljane repice - za suzbijanje repičinog sjajnika (*Meligethes aeneus*)
· Šećerne repe - za suzbijanje lisnih sovica (*Mamestra spp.*)

NAČIN DELOVANJA

Lambda-cihalotrin je aktivna materija koja pripada grupi piretroida koja remeti protok natrijumovih jona kroz nervne membrane, usled čega dolazi do uginuća insekata.

CAPSULE-MAN tehnologija obezbeđuje dodatnu zaštita od UV zračenja, pH ekstrema i nepovoljnih temperatura tj. produženu postojanost preparata.



NAPOMENA:

Mikrokapsule omogućavaju oslobađanje aktivne materije tek nakon aplikacije i poboljšanu bezbednost rukovaoca. Može se mešati sa preparatima koji nisu alkalne reakcije.



ŽUPA
HEMIJSKA INDUSTRIJA
KRUŠEVAC - SRBIJA

TAJFUN

1l

Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  cipermetrin 200 g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrat za emulziju (EC)
- **KARENCA:**
  56 dana za vinovu lozu
  BROJ TRETIRANJA:
  jednom na istoj površini u toku godine


PRIMENA

VINOVA LOZA
Primenjuje za suzbijanje prve ili druge generacije sivog grozdovog smotavca (*Lobesia botrana*), u koncentraciji 0,015 - 0,03 % (1 ,5 – 3ml u 10l vode).

Utrošak vode od 600-1000l/ha.

Vreme primene je 7-8 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na počeku piljenja prvih gusenica.

Aktivna materija cipermetrin se primenjuje kod:
· Jabuka - za suzbijanje jabukinog smotavca (*Cydia pomonella*)
· Kruška- za suzbijanje obične kruškine buve (*Cacopsylla pyri*)
· Krompir- za suzbijanje krompirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*)
· Šećerna repa - za suzbijanje lisnih sovica (*Mamestra spp.*)
· Pšenica - za suzbijanje žitne pijavice (*Oulema melanopus*)
· Uljana repica- za suzbijanje repičinog sjajnika (*Melighetes aeneus*)



NAPOMENA:

Ne sme se primenjivati u vreme leta pčela. Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.

Može se mešati sa preparatima na bazi: malationa,hlorpirifosa,hlorpirifos-metila, cimazola.

Ne sme se mešati sa alkalnim preparatima i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola ili drugih alkohola.



BELCHIM
CROP PROTECTION

TEFLIX

10kg

TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (*Elateridae*), larve gundelja (*Scarabaeidae*), larve kukuruzne zlatice (*Diabrotica sp.*).

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  teflutrin 15 g/kg
- **FORMULACIJA:**
  mikrogranule (MG)
- **KARENCA:**
  obezbeđena vremenom primene.

PRIMENA

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se u količini od 5 - 8 kg/ha tokom setve, unošenjem u zemljište (depozitorima) u zoni redova pored semena.

KUKURUZ I SUNCOKRET
Primenjuje se u količini od 5 - 10 kg/ ha unošenjem u zemljište (depozitorima) u zoni redova pored semena.

NAČIN DELOVANJA

Aktivna materija teflutrin poseduje visok napon pare i brzo se raspoređuje unutar zemljišta gde dolazi u kontakt sa štetočinom, prodire kroz kutikulu prouzrokujući paralizu i kao krajnji rezultat uginjavanje insekta.



NAPOMENA:

Unapređena formulacija proizvoda TEFLIX je u specijalnom mineralnom nosaču koji omogućava bolju stabilnost aktivne materije, i njeno produženo oslobađanje u zemljištu sa insekticidnim delovanjem i do 90 dana nakon primene. Specijalno formulisan mineralnim nosačima Teflix pruža: veću stabilnost aktivne materije za sigurnije skladištenje, transport i primenu; sporije otpuštanje aktivne materije za dugotrajniju zaštitu od štetnih insekata; ekološki prirodni mineralni nosači, koji ne remeti ekosistem zemljišta



Sharda Cropchem

NEXT®

1l

NEXT® je regulator rasta biljaka koji se primenjuje u usevu ječma.

- **AKTIVNA MATERIJA:**
  trineksapak-etil 250g/l
- **FORMULACIJA:**
  koncentrovana emulzija (EC)
- **KARENCA:**
  35 dana za ječam
- **BROJ TRETIRANJA:**
  jednom na istoj površini u toku godine.


PRIMENA

JEČAM
Primenjuje za sprečavanje poleganja, u količini 0,4 - 0,6 l/ha od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara (BBCH 31-39).

Utrošak vode 200 - 400 l/ha.

NAČIN DELOVANJA

Pojačava razvoj korena, debljinu i čvrstoću stabla i skraćuje internodije dovodeći do smanjenja visine useva i na taj način otklanjajući sve moguće uzroke poleganja strnih žita.



NAPOMENA:

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

HIBRID KOJI VAS NEĆE IZNEVERITI


FILIGRAN

FAO 450



GRINGO FAO 270 | BIZERBA FAO 380
DASTIN FAO 400 | DECORUM FAO 480

LG AMBASSADOR



NAJPRODAVANIJI HIBRID U EVROPI

BELEŠKE

BELEŠKE

BELEŠKE

AGROGLOBE

SKENIRAJ

Katalog je informativnog karaktera. Informacije o proizvodima koji su u njemu predstavljeni ne mogu se smatrati garancijom koju Agroglobe daje vezano za korišćenje i prikladnost tih proizvoda. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu i sigurnosne mere koje su navedene na etiketi.

Kontakt



Vladimir Trivković
direktor prodaje semena i pesticida
vladimir.trivkovic@agroglobe.rs
tel: 064 871 34 58



JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Dimitrije Dokić
komercijalno stručni saradnik
dimitrije.dokic@agroglobe.rs
tel: 064 871 35 17



ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Božana Vuksić
komercijalno stručni saradnik
bozana.vuksic@agroglobe.rs
tel: 064 871 34 69



SREM I MAČVA

Mihailo Bošković
komercijalno stručni saradnik
mihailo.boskovic@agroglobe.rs
tel: 064 871 10 69



JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Nikola Terzić
komercijalno stručni saradnik
nikola.terzic@agroglobe.rs
tel: 064 871 34 54

Agroglobe doo
Bulevar oslobođenja 60
21000 Novi Sad
www.agroglobe.rs